

Tiolene®



- › Fungicida a base di zolfo in formulazione flowable
- › Particelle finemente micronizzate e disperse in acqua
- › Ottima ed uniforme copertura della vegetazione trattata
- › Attivo verso tutte le forme di oidio con meccanismo aspecifico
- › Elevata adesività, resistenza al dilavamento e persistenza

COMPOSIZIONE

zolfo (esente da selenio) 56,09% (800 g/l)

FORMULAZIONE

sospensione concentrata (SC)

CODICE FRAC

M02

REG. MIN. SALUTE

n° 7764 del 28.04.1989

BUFFER ZONE

Non previste

INDICAZIONI DI PERICOLO

CLP: EUH208; EUH210; EUH401



SETTORI DI IMPIEGO

Coltura	Avversità	Dose	Note	Phi	Max
Vite	Oidio				
Pomacee	Ticchiolatura, Oidio, Eriofidi	3-4 l/ha	Trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi, intervenendo ogni 7 gg (intervallo minimo)	5 gg	8
Drupacee	Oidio, Bolla				
Nocciolo	Oidio, Eriofidi				
Pomodoro e altri ortaggi a frutto (Solanacee, Cucurbitacee) in campo e serra	Oidio	2 l/ha	Trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi, intervenendo ogni 10 gg (intervallo minimo)	3 gg	6
Cavoli, Ortaggi a stelo in campo					
Legumi freschi e da granella in campo					
Floreali ed Ornamentali in pieno campo e serra, Forestali	Oidio	3 l/ha		n.r.	5
Cereali	Oidio	8-10 l/ha		5 gg	4
Riso	Brusone	4-8 l/ha	Effettuare massimo 3 trattamenti ogni 8-10 gg nel periodo compreso tra la formazione del panico (BBCH 31) e la maturazione lattea (BBCH 75), in funzione dello sviluppo della malattia	n.r.	3

Prodotto originale Diachem



FLACONE

1 l (cartone 10 pz)

TANICA

5 l (cartone 4 pz)

TANICA

10 l

AVVERTENZE

Non compatibile con oli minerali e captano; se si usa un olio minerale estivo è possibile distanziare i trattamenti come specificato nel paragrafo "avvertenze" di Agrumin. Può risultare fitotossico su alcune cultivar di Melo, Pero e Cucurbitacee (vedi etichetta). Nei trattamenti su cucurbitacee, colture floricole ed ornamentali si consigliano saggi preliminari. In serra e con elevate temperature impiegare dosi ridotte.