

Contender® Plus



- › Fungicida sistemico in granuli idrodispersibili
- › Elevata redistribuzione in senso acropeto e basipeto
- › Rapida penetrazione nei tessuti vegetali e prevenzione dilavamento

COMPOSIZIONE

fosetil alluminio puro 80%

FORMULAZIONE

granuli idrodispersibili (WG)

CODICE FRAC

P07

REG. MIN. SALUTE

n° 17532 del 26.02.2020

BUFFER ZONE

Non previste

INDICAZIONI DI PERICOLO

CLP: EUH210; EUH401



SETTORI DI IMPIEGO

Cultura	Avversità	Dose	Note	Phi	Max
Vite	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>)	250 g/hl (max 8 kg s.a./ha/anno)	Iniziare i trattamenti preventivamente in fase di attiva crescita, proseguendo ogni 10-14 giorni. Si consiglia l'associazione con prodotti di copertura in caso di forte pressione della malattia	28 gg	6
Agrumi (Arancio, Limone, Mandarino, Pompelmo)	Gommosi (<i>Phytophthora</i> spp.)	225-300 g/hl (max 8 kg s.a./ha/anno)	- 2 applicazioni in primavera e 2 applicazioni in autunno con 21-35 giorni tra applicazioni consecutive; oppure - 2 applicazioni in autunno-inverno con 21-35 giorni tra applicazioni consecutive	15 gg	4
Pomacee (Melo, Pero)	Ticchiolatura (<i>Venturia inaequalis</i> , <i>Venturia pyrina</i>)	150 g/hl (max 8 kg s.a./ha/anno)	Iniziare i trattamenti preventivamente in fase di attiva crescita, proseguendo ogni 10-14 giorni. Si consiglia l'associazione con prodotti di copertura per una migliore efficacia	40 gg	6
Cetriolo e zucchini (in serra)	Peronospora (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	4 kg/ha (max 8 kg s.a./ha/anno)	Si raccomanda la dose ridotta di 1 kg/ha subito dopo il trapianto. Intervenire ogni 10-14 gg dal trapianto	3 gg	4
Melone e cocomero (in pieno campo e serra)	Peronospora (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	2,5-3 kg/ha (max 8 kg s.a./ha/anno)	Consentito un trattamento alla dose massima di 4 kg/ha. Si raccomanda la dose ridotta di 1 kg/ha subito dopo il trapianto. Intervenire ogni 10-14 gg dal trapianto. Non usare la dose massima nell'ultimo trattamento	15 gg	4
Lattughe e simili (in campo e serra)	Peronospora (<i>Bremia lactucae</i>)	2-3 kg/ha	Intervenire ogni 10-14 gg dal trapianto. Si consiglia di effettuare una prova di selettività su <i>Lactuca sativa</i> var. romana prima dell'impiego	15 gg	2



SACCHETTO
1 kg (cartone 14 pz)

SACCO
5 kg (cartone 4 pz)

AVVERTENZE

Non miscelare con fertilizzanti contenenti azoto e con formulati oleosi.
Si sconsiglia la miscelazione con formulati contenenti rame.