

# Axidor

- › FUNGICIDA PREVENTIVO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA
- › AZIONE SPECIFICA CONTRO LA PERONOSPORA DI PATATA E POMODORO
- › ATTIVITÀ SISTEMICA E CITOTROPICA CON PREVENZIONE DEL DILAVAMENTO

<b>COMPOSIZIONE</b> propamocarb cloridrato 36,87% (400 g/l) cimoxanil 4,61% (50 g/l)	<b>FORMULAZIONE</b> sospensione concentrata (SC)	<b>INDICAZIONI DI PERICOLO</b> CLP: H290; H317; H361fd; H411; EUH401	<b>REG. MIN. SALUTE</b> n° 15290 del 29.12.2011
<b>CODICE FRAC</b> 28 27	<b>BUFFER ZONE</b> Non previste		

## SETTORI DI IMPIEGO

 COLTURA	 AVVERSITÀ	 DOSE	 NOTE	 PHI	 MAX
Patata	Peronospora	2,5 l/ha	Iniziare i trattamenti quando si manifestano le condizioni favorevoli alle infezioni (piogge e/o bagnature), al più tardi alla comparsa dei primi sintomi, ad intervalli di 7 giorni fra le applicazioni	14 gg	6
Pomodoro (in campo e in serra)	Peronospora	2,5 l/ha	Iniziare i trattamenti quando si manifestano le condizioni favorevoli alle infezioni (piogge e/o bagnature), al più tardi alla comparsa dei primi sintomi, ad intervalli di 7-10 giorni fra le applicazioni	3 gg	3

Prodotto originale UPL

