

Keops

- ▶ ERBICIDA DI PRE E POST-EMERGENZA PER VITE, AGRUMI, OLIVO E AREE NON COLTIVATE
- ▶ AGISCE CON MODALITÀ SISTEMICA PENETRANDO NEI TESSUTI PER VIA FOGLIARE E ASSORBIMENTO RADICALE
- ▶ AGISCE NEI CONFRONTI DI INFESTANTI GRAMINACEE E DICOTILEDONI, ANNUALI E PERENNI



COMPOSIZIONE
flazasulfuron 25%

FORMULAZIONE
granuli idrodispersibili (WG)

INDICAZIONI DI PERICOLO
CLP: H410; EUH401

REG. MIN. SALUTE
n° 17534 del 31.07.2020

CODICE HRAC
B

BUFFER ZONE
Consultare l'etichetta



Attenzione

SETTORI DI IMPIEGO

COLTURA	DOSE	FASE D'INTERVENTO	PHI	MAX	ATTIVITÀ ERBICIDA
Vite	160 g/ha	Intervenire effettuando un trattamento sotto la fila tra fine inverno (febbraio) e inizio primavera	75 gg	1	Infestanti sensibili Graminacee: <i>Avena fatua</i>), <i>Digitaria sanguinalis</i> , <i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>Lolium multiflorum</i> , <i>Lolium perenne</i> , <i>Lolium rigidum</i> , <i>Poa annua</i> , <i>Setaria pumila</i> , <i>Setaria verticillata</i> , <i>Setaria viridis</i>
Agrumi	160 g/ha	Effettuare un trattamento fra aprile e agosto	45 gg	1	Dicotiledoni: <i>Amaranthus retroflexus</i> , <i>Chenopodium album</i> , <i>Diplotaxis erucoides</i> , <i>Erigeron canadensis</i> , <i>Erigeron sumatrensis</i> , <i>Geranium dissectum</i> , <i>Geranium rotundifolium</i> , <i>Lamium</i> spp., <i>Capsella bursa-pastoris</i> , <i>Portulaca oleracea</i> , <i>Senecio vulgaris</i> , <i>Stellaria media</i> , <i>Taraxacum officinalis</i> , <i>Trifolium</i> spp.
Olivo	160 g/ha	Effettuare un trattamento fra ottobre e marzo	45 gg	1	
Aree non destinate a colture agrarie: strade ferrate, aree industriali, aree e opere civili (ruderi storici, cimiteri, piazzali, banchine stradali, terreni destinati a impianti di pannelli fotovoltaici), aree urbane e agricole non coltivate	200 g/ha	Intervenire secondo necessità		1	Infestanti mediamente sensibili Dicotiledoni: <i>Sonchus arvensis</i> , <i>Sonchus oleraceus</i>

Nel caso in cui non si abbia l'esigenza di effetti particolarmente persistenti, KEOPS può essere impiegato ad una dose ridotta di 60-80 g/ha in miscela con preparati a base di glifosate (GLIFENE HP).

Prodotto originale Rotam

FLACONCINO
200 g (cartone 10 pz)



AVVERTENZE

Su vite, agrumi e olivo i trattamenti devono essere effettuati in banda, lungo il sottofila, o in aree localizzate, su una superficie non superiore ad 1/3 di quella coltivata. Dopo l'applicazione, prima di rientrare nelle aree trattate, attendere un tempo minimo di 6 ore.