

Blaise Ultra

► FUNGICIDA FOGLIARE SISTEMICO PER IL CONTROLLO DELLE PATOLOGIE DI CEREALI, VITE E ORTICOLE (IN SERRA)

COMPOSIZIONE

azoxystrobin 11,03% (120 g/l)
tebuconazolo 18,4% (200 g/l)

CODICE FRAC

11
3

FORMULAZIONE

sospensione concentrata (SC)

BUFFER ZONE

Consultare l'etichetta

INDICAZIONI DI PERICOLO

H302; H361d; H410; EUH208;
EUH401



Attenzione

REG. MIN. SALUTE

n° 17358 del 19.02.2019

SETTORI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE	NOTE	PHI	MAX
Grano tenero e duro, Triticale	Fusariosi (<i>Fusarium</i> spp.); Oidio (<i>Erysiphe</i> spp.); Ruggini (<i>Puccinia</i> spp.); Septoria (<i>Septoria</i> spp.)	1-1,25 l/ha	Intervallo tra i trattamenti 14-21 gg	35 gg	2
Orzo	Oidio (<i>Erysiphe</i> spp.); Ruggini (<i>Puccinia</i> spp.); Rincosporiosi (<i>Rhynchosporium</i> spp.); Elmintosporiosi (<i>Pyrenophora</i> spp.)	1-1,25 l/ha	Intervallo tra i trattamenti 14-21 gg	35 gg	2
Cetriolo, Zucchini (uso in serra)	Oidio (<i>Sphaerotheca</i> spp., <i>Erysiphe</i> spp.)	0,5-1 l/ha	Intervallo tra i trattamenti 10-14 gg	3 gg	3
Melone (uso in serra)	Oidio (<i>Erysiphe</i> spp.)	0,5-1 l/ha	Intervallo tra i trattamenti 10-14 gg	7 gg	3
Pomodoro, Melanzana (uso in serra)	Oidio (<i>Leveillula taurica</i> , <i>Sphaerotheca</i> spp., <i>Erysiphe</i> spp.)	0,5-1 l/ha	Intervallo tra i trattamenti 10-14 gg	3 gg	3
Peperone (uso in serra)	Oidio (<i>Leveillula taurica</i> , <i>Sphaerotheca</i> spp., <i>Erysiphe</i> spp.)	0,5-1 l/ha	Intervallo tra i trattamenti 10-14 gg	3 gg	2
Aglione, Cipolla (uso in serra)	Ruggini (<i>Puccinia</i> spp.)	0,5-1 l/ha	Intervallo tra i trattamenti 10-14 gg	21 gg	2
Vite	Oidio (<i>Uncinula necator</i>)	0,75 l/ha	Intervallo tra i trattamenti 10-14 gg	21 gg	2

Prodotto originale Adama

FLACONE
1 litro (cartone 12 pz)

TANICA
5 litri (cartone 4 pz)



AVVERTENZE

Blaise Ultra va utilizzato preventivamente. Si consiglia di utilizzare Blaise Ultra nei periodi critici di sviluppo delle patologie delle colture.

