

## Insetticida adatto alla protezione degli apparati radicali di numerose colture erbacee ed orticole

**Poker<sup>®</sup> Geo** è un formulato insetticida a base di *Lambda-cialotrina*.

La molecola piretroide è dotata di lunga persistenza d'azione ed effetto repellente. Biologicamente attiva a bassi dosaggi, agisce per contatto ed ingestione, con rapido effetto abbattente su numerosi insetti terricoli.

### Una scelta vincente

Attivo su numerosi insetti del terreno. Non conferisce sapori/odori sgradevoli alle colture trattate.



**Composizione**  
Lambda-cialotrina 0,4%

**Formulazione**  
Granulare

### Confezioni



**Registrazione**  
n° 17261 del 31.07.2018



**Modalità d'impiego** (impiegabile solo in pieno campo)

Colture	Avversità	Dosi (kg/ha)	Note	N° max tratt./anno	Periodo carenza
<p><b>Mais*, Patata**, Mais dolce, Sorgo e Miglio, Carota, Colza, Tabacco, Soia, Barbabietola da zucchero, Cotone, Girasole, Solanacee (Pomodoro, Melanzana, Peperone), Cucurbitacee (Cetriolo e Zucchini, Melone, Anguria e Zucca), Lattughe e simili (Lattuga a cappuccio, Lattughe da taglio, tipo "Iceberg", Romana, Scarole, Cicorie, Radicchi, Indivie, Crescione, Rucola, Dolcetta, Barbarea, prodotti Baby-Leaf), Spinaci e simili, Cavoli ad infiorescenza (Cavolfiori, Broccoli, Cime di rapa), Cavoli a testa (Cavoli verza, Cavoli cappuccio) ed altri, semi di Papavero, Floreali ed ornamentali, Vivai di piante arboree.</b></p> <p><b>Colture porta-seme destinate esclusivamente alla produzione di materiale riproduttivo (da seme): Cavoli ad infiorescenza, Cavoli a testa, Cucurbitacee, Spinaci e simili, Lattughe e simili, Mais, Colza, Sorgo e Miglio, Barbabietola da zucchero, Carota, Patata, Solanacee, Soia, Girasole.</b></p>	Insetti terricoli quali Nottue, Elateridi, larve di Diabrotica, Tipule, Bibionidi e altri Ditteri.	10-15	<p>Impiego localizzato nel solco di semina o di trapianto.</p> <p>*Mais: localizzato alla semina alla dose di 10-15 kg/ha e/o distribuito interrato lungo la fila, entro la fase di rincalzatura del mais, alla dose di 12-15 kg/ha per un ottimale controllo delle larve di Diabrotica.</p> <p>**Patata: localizzato alla semina e/o distribuito interrato durante la fase di rincalzatura, per un ottimale controllo delle larve di Elateridi.</p>	1 (2 tratt. per Mais, Patata, Mais dolce, Sorgo e Miglio)	-

### Compatibilità

Il prodotto va impiegato da solo.

### Avvertenze

Trattare esclusivamente alla semina o al trapianto.

Non impiegare sulle colture in presenza di api.

*Agrofarmaco autorizzato dal Min. della Salute. Le informazioni sopraindicate sono indicative e parziali, prima dell'uso leggere sempre l'etichetta sul prodotto, con particolare attenzione alle frasi e simboli di pericolo.*