



# Dipiril

DIRIPIL è un diserbante che agisce essenzialmente per contatto, venendo assorbito localmente dalle foglie e dai germinelli e in maniera minore dalle radici.  
È efficace contro le seguenti infestanti: Coda di Topo (*Alopecurus spp.*) Fienarola Annuo (*Poa Annuua*) Zizzania (*Lolium temulentum*),

Borsa del Pastore (*Capsella bursa pastoris*), Camomilla (*Matricaria spp.*), Centocchio (*Stellaria spp.*), Papavero (*Papaver spp.*), Ranuncolo (*Ranunculus spp.*), Veccia (*Vicia spp.*), Vilucchio comune (*Convolvulus arvensis*), Acetosella (*Oxalis spp.*),

<b>COMPOSIZIONE</b>	Oxyfluorfen puro g 22 (=240 g/l) Coadiuvanti q. b. a g 100	<b>CLASSIFICAZIONE</b>	II
<b>FORMULAZIONE</b>	Emulsione concentrata	 (H304; H336; H410)	
<b>REG. MIN.SALUTE:</b>	N° 17344 del 22.01.2019		
<b>INTERVALLO DI SICUREZZA:</b>	Non previsto		

## SETTORI DI IMPIEGO

COLTURA	DOSE	NOTE	NOTE
<b>VITE, POMACEE, DRUPACEE, NOCCIOLO, ARANCIO, LIMONE, POMPELMO</b>	2 l/ha	Modalità di applicazione: in tutte le colture il prodotto deve essere impiegato solo con applicazioni in bande lungo la fila, nel periodo compreso tra l'ultima decade di settembre e la prima decade di maggio. Impiegare esclusivamente in bande sotto chioma lungo i filari (non trattare l'area tra le file). L'area delle bande trattate non deve superare il 30% della superficie totale. Pre-emergenza delle infestanti: il prodotto va impiegato preferibilmente nel tardo autunno-inizio inverno alla dose di 2 l/ha di superficie effettivamente trattata. Post emergenza delle infestanti: Dipiril deve essere impiegato alla dose di 2 l/ha di superficie effettivamente trattata in miscela con erbicidi ad attività fogliare. Post emergenza su graminacee perenni: in presenza di <i>Cynodon spp.</i> , <i>Agropyron spp.</i> , <i>Agrostis spp.</i> , <i>Bromus spp.</i> , utilizzare Dipiril alla dose di 2/ha di superficie effettivamente trattata in miscela con graminicidi specifici. Nei vigneti, frutteti e agrumeti, il prodotto va impiegato a partire dal 2 anno d'impianto e distribuito durante il periodo di dormienza) fino a 20 giorni prima dell'inizio del germogliamento.	
<b>GIRASOLE</b>	1 l/ha	Il prodotto può essere impiegato su colture seminate a file di almeno 60-65 cm di larghezza, con applicazioni in bande di 25-30 cm di larghezza. Intervenire in preemergenza della coltura alla dose di 1l/ha di superficie effettivamente trattata. Eventuali piogge violente nella fase di emergenza, potrebbero produrre temporanei sintomi fitotossici sulle prime foglie, e che scompaiono entro breve tempo.	
<b>CARCIOFO</b>	1-2 l/ha	Impiegare il prodotto solo lungo la fila della coltura su una banda di 25-30 cm di larghezza: a) in preemergenza autunnale della coltura (subito dopo l'impiantop o la riattivazione della coltura) a 1-1,5 l/ha di superficie effettivamente trattata; b) in post emergenza invernale della coltura: quando l'Oxalis è nelle prime fasi fenologiche a 2l/ha di superficie effettivamente trattata. Attenzione: proteggere il carciofo con opportuna schermatura.	

## AVVERTENZE

Su tutte le colture effettuare massimo un trattamento per anno.  
Non trattare in giornate con presenza di vento onde evitare che la nube irrorante giunga a contatto con colture sensibili.

## COMPATIBILITÀ

Compatibile con preparati a base di Diquat e Glifosate.

## PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto ed il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.