

Poly-Feed™ G.G.

Concimi idrosolubili Greenhouse Grade.
La miglior qualità a portata di tutti.

Dosi e modalità d'impiego

Nutrigation™ 30-50 kg/ha ad una concentrazione compresa tra 0,1-0,3%.

Non superare 15-20% nella preparazione delle soluzioni madri.

Fogliare 200-500 g/hl, non superare la concentrazione dell'1% in miscela con altri prodotti.

Confezione

- Sacchi da 25 kg su pallet da 1.200 kg.

Uso



Analisi del prodotto

	Unità	11.44.11	12.18.27+Mg	16.6.31+Mg	18.18.18+Mg	20.20.20
Azoto (N) Totale	%	11,0	12,0	16,0	18,0	20,0
Azoto (N-NO ₃) nitrico	%	3,1	8,2	8,8	5,1	5,7
Azoto (N-NH ₄) ammoniacale	%	7,9	3,8	1,2	3,5	3,9
Azoto (N-NH ₂) ureico	%	-	-	6,0	9,4	10,4
Anidride fosforica (P₂O₅) solubile in acqua	%	44,0	18,0	6,0	18,0	20,0
Ossido di Potassio (K₂O) solubile in acqua A basso tenore di Cloro	%	11,0	27,0	31,0	18,0	20,0
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua	%	-	2,0	2,0	2,0	-

Microelementi solubili in acqua	Unità	B	Cu EDTA	Fe EDTA	Mn EDTA	Mo	Zn EDTA
Top ME	ppm	200	110	1000	500	70	150
Standard ME	ppm	100	55	500	250	35	75

	11.44.11	12.18.27+Mg	16.6.31+Mg	18.18.18+Mg	20.20.20
Pacchetto Haifa Micro™	Standard	Standard	Standard	Top	Standard
Uso in fuorisuolo	✓	✓	✗	✗	✗

pH e Conducibilità della soluzione al variare della concentrazione

Formula	1,0 g/l		2,0 g/l		3,0 g/l	
	pH	EC	pH	EC	pH	EC
11.44.11	4,8	1,080	4,7	1,960	4,7	2,900
12.18.27+Mg	5,2	1,010	5,0	1,750	5,0	2,520
16.6.31+Mg	5,8	0,990	5,6	1,790	5,5	2,460
18.18.18+Mg	5,9	1,160	5,7	2,260	5,7	3,300
20.20.20	5,2	0,900	5,1	1,750	5,0	2,580

Massima solubilità al variare della temperatura

Massima solubilità % p/v	11.44.11 STD ME	12.18.27 STD ME	16.6.31 H ME	18.18.18 H ME	20.20.20 STD ME
10°C	20	28	18	35	24
20°C	40	35	30	42	40
30°C	42	39	33	45	44