Capital SH



- > Fungicida in granuli idrodispersibili per la protezione di melo e pero
- > Azione preventiva multisito di contatto contro ticchiolatura e marciumi

COMPOSIZIONE

Captano 80%

FORMULAZIONE

granuli idrodispersibili (WG)

CODICE FRAC

M04

REG. MIN. SALUTE

nº 16403 del 07.07.2015

BUFFER ZONE

Consultare l'etichetta

INDICAZIONI DI PERICOLO

H317; H318; H332; H351; H400; EUH401



Pericolo







SETTORI DI IMPIEGO

Coltura	Avversità	Dose	Note	Phi	Max
Melo, Pero	Ticchiolatura (Venturia inaequalis), Gloeosporium spp., Monilia spp.	1,88 kg/ha	Trattamenti preventivi dalla comparsa dei mazzetti fiorali (BBCH51/aprile). Rispettare un intervallo minimo fra i trattamenti di 10 giorni.	21 gg	7
Pesche e Nettarine (applicazioni tardive, "al verde")	Bolla del pesco (Taphrina deformans)	1,8 kg/ha	Impiegare il prodotto a partire dalla fine della fioritura. Tra un trattamento e quello successivo lasciare trascorrere 14 giorni.	21 gg	2
Pesche, Nettarine e albicocche (applicazioni tardive, "al verde")	Marciume bruno (<i>Monilia</i> spp.)	1,8 kg/ha	Impiegare il prodotto a partire dalla fine della fioritura. Tra un trattamento e quello successivo lasciare trascorrere 14 giorni.	21 gg	2
Ornamentali in serra	Maculatura fogliare	0,4-0,8 kg/ha	Impiegare il prodotto a partire dallo sviluppo delle foglie fino a fine fioritura. Tra un trattamento e quello successivo lasciare trascorrere minimo 10 giorni.	-	3
Vivai di piante ornamentali e di colture arboree in serra	Maculatura fogliare	0,4-0,8 kg/ha	Impiegare il prodotto a partire dallo sviluppo delle foglie fino a fine fioritura. Tra un trattamento e quello successivo lasciare trascorrere minimo 10 giorni.	-	3





Al fine di ridurre il rischio di fenomeni di fitotossicità, si sconsiglia l'impiego del prodotto su alcune varietà di Melo (Stark, Delicious, Stayman, Renetta del Canada, Winesap) e di Pero (Butirra d'Anjou, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna).