

Shelter®



- › Fungicida citotropico ad azione preventiva e curativa
- › Effetto bloccante con interventi tempestivi su infezioni in atto
- › Formulazione ad elevata concentrazione in granuli idrodispersibili
- › Elevata attività biologica nei confronti delle peronosporacee

COMPOSIZIONE

cimoxanil 45%

FORMULAZIONE

granuli idrodispersibili (WG)

CODICE FRAC

27

REG. MIN. SALUTE

n° 11133 del 08.01.2002

BUFFER ZONE

Non previste

INDICAZIONI DI PERICOLO

CLP: H361fd; H373; H410; EUH208; EUH401



Attenzione



SETTORI DI IMPIEGO

Coltura	Avversità	Dose	Note	Phi	Max
Vite		30-35 g/hl (300-330 g/ha)	Iniziare i trattamenti preventivamente, con intervallo minimo tra le applicazioni di 7 gg	28 gg	4
Patata		30-35 g/hl (300-330 g/ha)	Iniziare i trattamenti preventivamente, con intervallo minimo tra le applicazioni di 7 gg	7 gg	5
Pomodoro, Melanzana (pieno campo e serra)		30-35 g/hl (300-330 g/ha)	Iniziare i trattamenti preventivamente, con intervallo minimo tra le applicazioni di 7 gg	3 gg	5
Melone, Anguria, Zucca (pieno campo)	Peronospora	30-40 g/hl (300-400 g/ha)	Iniziare i trattamenti preventivamente, con intervallo minimo tra le applicazioni di 8 gg	11 gg	4
Zucchini, Cetriolo (pieno campo e serra)		30-40 g/hl (300-400 g/ha)	- In pieno campo	3 gg	4
		25-30 g/hl (270 g/ha)	- In serra		
Lattughe (pieno campo)		30-40 g/hl (300-400 g/ha)	Iniziare i trattamenti preventivamente, con intervallo minimo tra le applicazioni di 8 gg	10 gg	4
Spinaci (pieno campo)		30-40 g/hl (300-400 g/ha)	Iniziare i trattamenti preventivamente, con intervallo minimo tra le applicazioni di 8 gg	10 gg	4

Coltura	Avversità	Dose	Note	Phi	Max
Cipolla (pieno campo)	Peronospora	40-50 g/hl (400-500 g/ha)	Trattare fino alla fase con metà delle piante con foglie coricate. Intervallo minimo tra le applicazioni di 8 gg	10 gg	4
Carciofo (pieno campo)		30-40 g/hl (300-400 g/ha)	Trattare fino alla fase di raggiungimento del 50% della massa fogliare. Intervallo minimo tra le applicazioni di 8 gg	14 gg	3

Prodotto originale Sipcam-Oxon



ASTUCCIO
0,5 kg (cartone 20 pz)

SACCO
5 kg (cartone 4 pz)

AVVERTENZE

Evitare nella stessa stagione di effettuare trattamenti ripetuti di prodotto da solo, ricorrendo a miscele estemporanee ed all'alternanza con altri antiperonosporici. Non miscelare con prodotti a reazione alcalina.