

Novità

Afidane[®] 20 SG

- › Insetticida in granuli solubili attivo per contatto e ingestione
- › Elevata efficacia nei confronti degli afidi di pomacee e drupacee e meligete della colza
- › Attività sistemica con protezione della vegetazione formata dopo il trattamento

COMPOSIZIONE

acetamiprid 20%

FORMULAZIONE

granuli idrosolubili (SG)

CODICE IRAC

4A

REG. MIN. SALUTE

n° 18807 del 19.11.2024

BUFFER ZONE

Consultare l'etichetta

INDICAZIONI DI PERICOLO

CLP: H302; H361d; H410; EUH401



Attenzione

**SETTORI DI IMPIEGO**

Coltura	Avversità	Dose	Note	Phi	Max
Colza	Meligete	0,2 l/ha	Trattare entro la fine della fioritura	-	1
Pomacee	Afidi (ad eccezione di <i>Aphis spiraeicola</i>)	0,25 l/ha	Trattare in pre-fioritura (entro BBCH 59)	-	1
Pesche, Nettare, Ciliegie	Afidi	0,25 l/ha	Trattare in pre-fioritura (entro BBCH 59)	14 gg	2
Susine	Afidi	0,25 l/ha	Non trattare in fioritura (trattare entro BBCH 59 e dopo BBCH 69).	14 gg	2



FLACONE
500 g (cartone 12 pz)

AVVERTENZE

Adottare un intervallo di 120 gg per le colture in rotazione quando il prodotto è stato applicato su colza.