

Nimbus® Combi

- › Fungicida sistemico a base di azoxystrobin e difenoconazolo
- › Azione protettiva e curativa
- › Fungicida ad ampio spettro d'azione per barbabietola da zucchero e colture orticole

COMPOSIZIONE

azoxystrobin g 17,86 (200 g/l)
difenoconazolo g 11,16 (125 g/l)

FORMULAZIONE

sospensione concentrata (SC)

CODICE FRAC

11
3

REG. MIN. SALUTE

n° 18417 del 26.07.2023

BUFFER ZONE

Consultare l'etichetta

INDICAZIONI DI PERICOLO

CLP: H319; H351; H410; EUH401; EUH208



Pericolo



SETTORI DI IMPIEGO

Coltura	Avversità	Dose	Note	Phi	Max
Barbabietola da zucchero	Cercospora	0,5-0,8 l/ha	2 trattamenti a intervallo di 21 gg alla prima comparsa dei sintomi BBCH 31-39	21 gg	2
Pomodoro	Peronospora	1 l/ha	2 trattamenti a intervallo di 8-10 gg alla prima comparsa dei sintomi BBCH 20-59	2 gg	2
	Alternaria	1 l/ha	3 trattamenti a intervallo di 8-10 gg alla prima comparsa dei sintomi BBCH 20-59	3 gg	3
Melanzana	Oidio	1 l/ha	3 trattamenti a intervallo di 8-10 gg alla prima comparsa dei sintomi BBCH 20-59	3 gg	3
Carciofo	Bremia	1 l/ha	2 trattamenti a intervallo di 8-10 gg alla prima comparsa dei sintomi BBCH 41-81	7 gg	2
Cipolla	Ruggine	1 l/ha	2 trattamenti a intervallo di 14 gg alla prima comparsa dei sintomi BBCH 41-49	14 gg	2
Carota	Alternaria, Oidio	1 l/ha	3 trattamenti a intervallo di 14 gg ai BBCH 40-49	14 gg	3



FLACONE
11 (cartone 12 pz)
TANICA
51 (cartone 4 pz)

AVVERTENZE

Applicare il prodotto in modo preventivo o agli stadi precoci di sviluppo della malattia, evitando trattamenti curativi. In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.