

Five Fructus 18-9-36 + 6 CaO + 3 MgO

- › Concime a marchio CE secondo il Regolamento (UE) 2019/1009
- › Sospensione di concime NPK ad elevato contenuto in calcio e magnesio con microelementi. Si presenta come un fluido ad elevata concentrazione (p/v)
- › L'elevata concentrazione in elementi ad alto grado di purezza e solubilità permette di utilizzare dosi ridotte di prodotto rispetto ai tradizionali fertilizzanti liquidi e/o granulari
- › La solubilità attorno a 200g/l e l'elevata acidità permettono una rapida solubilizzazione, evitando l'otturazione dei filtri
- › Per l'elevato contenuto in potassio, calcio e magnesio, risulta indicato nelle fasi finali di maturazione al fine di contribuire al miglioramento degli aspetti qualitativi e alla conservabilità dei frutti a magazzino



COMPOSIZIONE

	% P/V	% P/P
azoto (N) totale	18,0	11,25
azoto nitrico (N-NO ₃)	14,6	9,1
azoto ureico (N-NH ₂)	3,6	2,15
anidride fosforica (P ₂ O ₅) totale	9,0	5,7
anidride fosforica (P ₂ O ₅) sol. in acqua	9,0	5,7
ossido di potassio (K ₂ O) sol. in acqua	36,0	22,7
ossido di calcio (CaO) sol. in acqua	6,0	3,9
ossido di magnesio (MgO) sol. in acqua	3,0	2

Contiene boro (B), molibdeno (Mo), e microelementi chelati
EDTA: rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), zinco (Zn)

FORMULAZIONE

sospensione concentrata
(GROGREEN GEL TECHNOLOGY)

DENSITÀ	pH (1%)
1.600 g/l	2,2

INDICAZIONI DI PERICOLO

CLP: H318



Pericolo

SETTORI DI IMPIEGO

In Fertilizzazione

Le dosi di impiego variano in funzione del tipo di coltura, della fertilità del suolo, della fase del ciclo colturale, dell'entità delle produzioni, etc. In linea generale si consiglia una dose compresa tra 5 e 10 kg/ha per applicazioni ripetute nel corso del ciclo colturale. Nel caso si preveda una sola applicazione, aumentare proporzionalmente la dose

Per applicazione fogliare

Alla dose di 2-5 kg/ha.
Non superare la concentrazione dello 0,5%
(500 g/100 l di acqua)

Prodotto originale LIMA Europe



BARATTOLO
5 kg (cartone 4 pz)

AVVERTENZE

Il prodotto è stabile se conservato a temperature comprese fra 5°C e 50°C.
Non esporre alla luce solare. Non miscelare con formulati a reazione alcalina